

[Ver otro ejemplo](#)

Ejemplo de cumplimiento del CRITERIO N° 5:

Metodología de revisión y síntesis de la literatura biomédica

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de GPC y recomendaciones sobre el manejo de la esquizofrenia en las bases de datos: **MEDLINE, National Guidelines Clearinghouse** y otros directorios de GPC como el de la **Scottish Intercollegiate Network, SIGN (descriptores utilizados: schizophrenia, clinical practice guideline)**. A los documentos obtenidos se les aplicó el cuestionario AGREE de evaluación de GPC que contiene 23 ítems distribuidos en 6 áreas (ver anexo 2).

De la búsqueda bibliográfica se identificaron 10 GPC^a o documentos de consenso con recomendaciones sobre el tratamiento de la esquizofrenia.⁴⁻¹³ La aplicación del cuestionario AGREE mostró que las GPC de mejor calidad fueron la de la American Psychiatric Association de 1996 (revisada en 2000)⁷ y la de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network de 1998.¹⁰ Ambas constituyeron el punto de partida de la presente GPC.

Después de determinar las GPC de mayor calidad y que iban a constituir la base de la presente GPC, se llevó a cabo una búsqueda específica en **MEDLINE (1966-2002), The Cochrane Library (Issue 4, 2002), y PsychInfo (1967-2001)** con el fin de actualizar y ampliar los contenidos sobre intervenciones psicosociales para la atención al paciente con esquizofrenia ya que en estas existe mayor variabilidad de práctica clínica, además de encontrarse mucha menos documentación de síntesis (tales como revisiones sistemáticas de calidad), que en las intervenciones psicofarmacológicas. Se utilizaron diversos **descriptores** tales como **schizophrenia, psychosis, severe mental disorder** y sus derivados, así como descriptores del tipo de publicación: **meta-analysis, systematic review, overview, randomized controlled trial o clinical trial**. Además, se desarrollaron búsquedas específicas para terapias o ámbitos de intervención en concreto en las que se utilizaron descriptores concretos (**psychosocial, socioenvironmental therapy, psychotherapy, cognitive therapy, therapeutic community, outpatient clinic, community mental health services, ambulatory care facilities, care management, assertive community treatment**). Se seleccionaron **revisiones sistemáticas**, los estudios con un diseño de **ensayo clínico aleatorizado**, o aquellos **estudios** donde, como mínimo, se incorporara un **grupo a comparar**. **Se excluyeron las revisiones no sistemáticas**, los estudios con diseños de **series de casos sin un grupo a comparar, o sin comparación antes y después, las descripciones de casos, los resúmenes y las comunicaciones a congresos**.

^a En diciembre de 2002, cuando esta GPC se había ya desarrollado, el National Institute for Clinical Excellence (NICE) británico publicó una GPC que no pudo ser incluida en el presente documento.

Referencia de la GPC:

San Emeterio M, Aymerich M, Faus G, Guillamón I, Illa JM, Lalucat L et al. **Guía de práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia**. Barcelona: Agència d' Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, **2003**

N° de Identificación de la GPC en el Portal GuíaSalud: (12)