

Tabla 19. Evaluación de los pensamientos suicidas en el paciente en la FFV (197)

<p>Examine los motivos por los que el paciente desea que su vida termine ahora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Explore el significado de su deseo de morir.
<p>Evalúe el control de los síntomas físicos y el dolor.</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Hay un dolor no tratado o tratado inadecuadamente que contribuye a su deseo de morir?• ¿Hay un síntoma no tratado o tratado inadecuadamente que contribuye a su deseo de morir?• ¿Hay miedos acerca del proceso de la muerte que contribuyen a su deseo de morir?• ¿Está sufriendo efectos adversos de fármacos que se pueden aliviar?
<p>Revise los apoyos sociales del paciente.</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Ha habido una pérdida, conflicto o rechazo reciente?• ¿Hay nuevos miedos de abandono o problemas económicos?• ¿Con quién ha hablado acerca de su plan de suicidio?• ¿Qué opinan estas personas acerca de ese plan?
<p>Evalúe su estado cognitivo.</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Hay déficit cognitivo?• ¿Hay síntomas o signos neurológicos nuevos?• ¿El paciente comprende su enfermedad, sus consecuencias y las consecuencias del suicidio?• ¿El juicio del paciente está distorsionado por la desesperación o por otros síntomas de la depresión?
<p>Evalúe su estado psicológico.</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Padece el paciente ansiedad, depresión, delirium u otro trastorno psiquiátrico no tratado o tratado deficientemente?• ¿Cómo está afrontando el paciente la pérdida de control, la dependencia, la incertidumbre y el duelo?
<p>Explore sus preocupaciones religiosas, espirituales y existenciales.</p> <ul style="list-style-type: none">• ¿Hay en estas áreas alguna cuestión o preocupación no resuelta o acuciante?