

## Anexo 10. Propuesta de evaluación. Indicadores

Los autores de esta GPC han diseñado unos indicadores con la finalidad de evaluar tanto la atención al paciente con DM 2 como el posible impacto de la implementación de la guía. No ha sido el propósito de los autores el diseñar una evaluación exhaustiva y detallada que implique la utilización de todos los indicadores propuestos. Se pretende proporcionar una herramienta a los clínicos y gestores interesados, que pueda ser útil en el diseño específico de la evaluación de la atención al paciente con DM 2.

Los indicadores propuestos son tanto de proceso (determinaciones de laboratorio y actividades de exploración y contenido de las consultas) como de resultados, intermedios o finales, esperables según los objetivos de control propuestos y que se supone, son la culminación de una buena y eficiente atención al paciente diabético tipo 2.

Los responsables de la evaluación del impacto de la GPC y de la atención a los pacientes diabéticos deberán elegir el periodo de tiempo más conveniente al que se refiere cada indicador.

<b>Indicadores de Proceso</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de pacientes <math>\geq 45</math> años con glucemia basal realizada en los últimos 3 años/Población <math>\geq 45</math> años (porcentaje)</li><li>• Número de pacientes diagnosticados de DM 2/población <math>\geq 15</math> años (porcentaje)</li><li>• Nº de pacientes DM 2 con dos determinaciones de HbA<sub>1c</sub> al año/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)</li><li>• Pacientes DM 2 &lt;75 años con cociente albúmina/creatinina realizado en el último año/Pacientes con DM &lt;75 años (porcentaje)</li><li>• Pacientes DM 2 con exploración de los pies realizada en el último año/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)</li><li>• Pacientes DM 2 con fondo de ojo realizado en los últimos 3 años/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)</li><li>• Pacientes con tres actividades educativas diferentes registradas en el último año/Pacientes con DM 2 (porcentaje)</li><li>• Pacientes con DM 2 en tratamiento con insulina y con registro de autoanálisis/Pacientes DM 2 en tratamiento con insulina (porcentaje)</li><li>• Pacientes con DM 2 sin tratamiento con insulina con indicación inadecuada del autoanálisis/Pacientes DM 2 sin tratamiento con insulina</li></ul>
<b>Indicadores de resultado Intermedios</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pacientes DM 2 con el promedio de las dos últimas HbA<sub>1c</sub> &lt;7%/Pacientes con DM 2 (porcentaje).</li><li>• Pacientes con DM 2 con el promedio de las dos últimas determinaciones de PA &lt; 140/80/ Pacientes con DM 2 (porcentaje).</li><li>• Pacientes con DM 2 no fumadores/Pacientes con DM 2 (porcentaje).</li><li>• Pacientes DM 2 tratados con metformina/Pacientes con DM 2 tratados con Antidiabéticos orales (porcentaje)</li><li>• Pacientes DM 2 registrados con úlceras o amputaciones/Pacientes con DM 2 (porcentaje).</li><li>• Pacientes DM 2 con enfermedad cardiovascular en tratamiento con estatinas y antiagregados/Pacientes con DM 2 y enfermedad cardiovascular.</li><li>• Pacientes DM 2 sin enfermedad cardiovascular con cálculo del riesgo coronario según la ecuación REGICOR/Pacientes con DM 2.</li><li>• Pacientes DM 2 sin enfermedad cardiovascular pero con riesgo coronario elevado en tratamiento con estatinas/Pacientes con DM 2 sin enfermedad cardiovascular.</li></ul>

#### **Indicadores de resultado finales**

- N° amputaciones de extremidades inferiores/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° pacientes con enfermedad renal terminal/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° fallecidos por enfermedad cardiovascular/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° pacientes con enfermedad coronaria/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° pacientes con enfermedad cerebrovascular/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° fotocoagulaciones y vitrectomías/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)
- N° ingresos por coma hiperosmolar o hipoglucemias/ Pacientes con DM 2 (porcentaje)