

Tabla 9. Fármacos para la neuropatía dolorosa en el paciente diabético (229)

Fármaco (N = Número de ensayos)	OR para alivio del dolor del 50% o eficacia moderada (IC 95%)	OR para discontinuación por efectos adversos (IC 95%)
Anticonvulsivantes tradicionales (carbamazepina, lamotrigina, valproato) (N = 4)	5,33 (1,77 a 16,02)	1,51 (0,33 a 6,96)
Anticonvulsivantes de nueva generación (oxcarbazepina, gabapentina, pregabalina) (N = 4)	3,25 (2,27 a 4,66)	2,98 (1,75 a 5,07)
Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, desipramina, imipramina) (N = 3)	22,24 (5,83 a 84,75)	2,32 (0,59 a 9,69)
Citalopram (N = 1)	3,5 (0,3 a 38,2)	5,6 (0,3 a 125,5)
Duloxetina 60 mg (N = 1)	2,36 (1,05 a 5,35)	
Duloxetina 120 mg (N = 1)	2,10 (1,03 a 4,27)	4,65 (2,18 a 9,94)
Opioides (oxicodona y tramadol) (N = 3)	4,25 (2,33 a 7,77)	4,06 (1,16 a 14,21)
Capsaicina 0,075% (N = 1)	2,37 (1,32 a 4,26)	4,02 (1,45 a 11,16)